

GLECAPREVIR/ PIBRENTASVIR (MAVIRET®)

Que es la Hepatitis C ?

Es una inflamació del fetge produïda per la infecció d'un virus

Per què s'ha de tractar la Hepatitis C?

Perquè el virus esta actiu i si no es tracta va deteriorant el fetge de manera progressiva i hi ha risc de desenvolupar una cirrosi hepàtica, descompensació hepàtica i risc de càncer de fetge.

Què busquem amb el tractament?

L'objectiu principal és curar la malaltia.

Al tenir el virus controlat es detindrà el deteriorament progressiu del fetge. Amb aquest fet pretenem no només prolongar la seva vida sinó millorar i mantenir la seva qualitat de vida, es a dir que es trobi bé.

Quin es el tractament?

El tractament de la Hepatitis C varia depenent del genotip del virus de la hepatitis C, de si el pacient ha rebut tractament anteriorment i del grau de fibrosis del fetge. En el seu cas el tractament es la combinació de dos fàrmacs: Glecaprevir/Pibrentasvir (Maviret®).

Aquest medicament es de Dispensació Hospitalària i els haurà de recollir en la Farmàcia del seu Hospital.

Com l'ha de prendre?

El Glecaprevir/Pibrentasvir (Maviret®) s'han de prendre tres comprimit junts diaris que s'administren amb aliments. Prendre sencer, no partir, dissoldre o mastegar.

Es recomana que begui abundants líquids durant el tractament.

Que fer si s'oblida de prendre una dosi de Maviret®?

L'ha de prendre tan aviat com sigui possible.

Si es dóna compte en el termini de **18 hores** des del moment en que pren Maviret® habitualment s'ha de prendre els 3 comprimits el més aviat possible i la dosi següent la pren a l'hora habitual. Si s'adona després de 18 hores o més des del moment en que s'ha pres Maviret® habitualment, esperar i prendre la següent dosi a l'hora habitual.

Si el pacient vomita en menys de 3 hores després de prendre Maviret® s'ha de prendre una dosi. Si vomita 3 hores després de prendre'l, no cal que es prengui un altra dosi fins al pròxim que tingui programat de forma regular.

No dobli mai la dosi.

Precaucions

Si té hipersensibilitat a Glecaprevir, Pibrentasvir o lactosa.

En cas de insuficiència hepàtica moderada i greu.

Es recomanen mesures anticonceptives eficaces durant el tractament a les dones en edat fèrtil o a les seves parelles de sexe masculí durant el tractament i durant els 6 mesos posteriors a la finalització del tractament. Està contraindicat l'ús d'etinilestradiol.

Si es quedés embarassada durant el tractament cal informar immediatament al seu metge.

Evitar l'alletament durant el tractament.

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir amb l'efecte del seu tractament. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic (Herba de sant Joan) o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Quins son els efectes secundaris més comuns?

Pot provocar:

- Cansament, astènia
- Nàusees
- Diarrea
- Cefalea

Davant qualsevol efecte advers no descrit en aquest document, que cregui que pot estar relacionat amb la medicació, cal comunicar-ho al seu metge

Es recomana No prendre alcohol per no augmentar la lesió del fetge

Com s'han de conservar?

Maviret® es conserven a Tª ambient.

Recordi:

Prengui el medicament com li ha indicat el seu metge.

El tractament és personal i no l'ha de utilitzar un altra persona.

Informi al seu metge o farmacèutic si esta prenen altres medicaments.

Mantingui el medicament fora l'abast dels nens.

No utilitzi el medicament un cop superada la data de caducitat (darrer dia del mes indicat en l'envàs)

Si vol saber més pot consultar..

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

<http://www.cdc.gov/spanish/az/h.html>

