

## **GOLIMUMAB (SIMPONI®)**

---

Simponi® conté el principi actiu Golimumab.

Golimumab és un agent biològic que actua reduint el dolor i la inflamació associat a certes malalties autoimmunes com artritis reumatoide, espondilitis anquilosant i artritis psoriàsica.


### ***Com s'ha de prendre?***

Simponi® s'administra per via subcutània (sota la pell). No administrar on la pell estigui envermellida, tingui un blau o estigui dura.

Simponi® s'administra un cop al mes. Triï un dia i administri sempre Simponi® el mateix dia de cada mes i a la mateixa hora.

Simponi® es conserva en el frigorífic. Tregui'l del frigorífic, 30 minuts abans d'administrar. No agitar.

El tap de la ploma s'ha de treure únicament en el moment de l'administració. Un cop retirat no torni a posar-lo fins després de l'administració.



### ***Que fer si s'oblida una dosi?***

Administri-la lo abans possible:

- Si la dosi s'ha demorat menys de dos setmanes, la dosi següent s'administrarà el mateix dia que estava previst inicialment, com si no s'hagués oblidat.
- Si la dosi s'ha demorat més de dos setmanes, la següent dosi serà després d'un més i establirà un nou calendari.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

### ***Precaucions***

Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu durant el tractament i fins sis mesos després de finalitzar el tractament.

Si es quedés embarassada durant el tractament cal informar immediatament al seu metge.  
Evitar l'alletament durant el tractament i fins sis mesos després de finalitzar el tractament.

El tap de l'agulla de la xeringa conté làtex, no el manipuli si té al·lèrgia al làtex.

Simponi® conté sorbitol com excipient, informi al seu metge o farmacèutic si té intolerància a la fructosa.

Algunes vacunes estan contraindicades durant el tractament amb Simponi®.  
Consulti amb el seu metge o farmacèutic abans de vacunar-se.

Si té una infecció activa com la grip, angines, úlcera en una cama... no ha de començar el tractament amb Simponi®.

### ***Presentacions comercials***

Presentacions en el nostre centre:

Simponi 50 mg pluma

Simponi 100mg pluma

### ***Interaccions amb altres medicaments***

Alguns medicaments poden interferir amb l'efecte de Simponi® . No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic

### ***Efectes secundaris***

Entre els efectes adversos més freqüents associat a Simponi® trobem:

risc augmentat de patir infeccions (que es poden manifestar amb febre, cansament, dificultat per respirar, pèrdua de pes, malestar general, problemes dentals, tos, molèsties a l'orinar); inflamació, dolor, envermelliment, pruija en el lloc d'injecció; reacció al·lèrgica (erupció cutània, dificultat per respirar, inflamació de la cara, mans o peus); trastorns gastrointestinals com estrenyiment, dispèpsia, dolor abdominal i gastrointestinal i alteracions hepàtiques com ulls i pell grogosa, orina color marró fosc, dolor abdominal costat dret, febre, sensació de mareig, vòmits i molt cansament.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquest efectes adversos.

### ***Conservació***

Conservi en nevera (entre 2 i 8°C).

Mantenir fora de l'abast dels nens

### ***Caducitat***

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l'envàs

### ***Si vol saber més pot consultar...***

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

