

LEDISPAVIR/ SOFOSBUVIR (HARVONI®)

Que es la Hepatitis C ?

Es una inflamació del fetge produïda per la infecció d'un virus

Per què s'ha de tractar la Hepatitis C?

Perquè el virus esta actiu i si no es tracta va deteriorant el fetge de manera progressiva i hi ha risc de desenvolupar una cirrosi hepàtica, descompensació hepàtica i risc de càncer de fetge.

Què busquem amb el tractament?

L'objectiu principal és curar la malaltia.

Al tenir el virus controlat es detindrà el deteriorament progressiu del fetge. Amb aquest fet pretenem no només prolongar la seva vida sinó millorar i mantenir la seva qualitat de vida, es a dir que es trobi bé.

Quin es el tractament?

El tractament de la Hepatitis C varia depenent del genotip del virus de la hepatitis C, de si el pacient ha rebut tractament anteriorment i del grau de fibrosis del fetge. En el seu cas el tractament es la especialitat Harvoni® que conté dos fàrmacs: Sofosbuvir i Ledipasvir

Aquest fàrmac es de Dispensació Hospitalària i l'haurà de recollir en la Farmàcia del seu Hospital

Com l'ha de prendre?

El Ledipasvir + Sofosbuvir (Harvoni®) es un comprimit diari que s'administra amb o sense aliments. Es recomana prendre sencer, ja que presenta sabor amarg.

Es recomana que begui abundants líquids durant el tractament

Que fer si s'oblida de prendre una dosi de Harvoni® ?

L'ha de prendre tan aviat com sigui possible.

Si es dona compte en el termini de **18 hores** des del moment en que pren Harvoni® habitualment s'ha de prendre el comprimit el més aviat possible i la dosi següent la pren a l'hora habitual. Si s'adona després de 18 hores o més des del moment en que s'ha pres Harvoni® habitualment, esperar i prendre la següent dosi a l'hora habitual.

No dobli mai la dosi.

Si vomita en menys de 5 hores després de prendre Harvoni® s'ha de prendre un altre comprimit. Si vomita després de més de 5 hores després de prendre'l, no cal que es prengui un altre comprimit fins al pròxim que tingui programat de forma regular.

Precaucions

Si té hipersensibilitat a Sofosbuvir, Ledipasvir o lactosa.

En cas de insuficiència renal greu:

Si el tractament es combina amb Ribavirina es recomanen mesures anticonceptives eficaces durant el tractament, tant en les pacients tractades com en les parelles de sexe femení dels pacients varons.

Si es quedés embarassada durant el tractament cal informar immediatament al seu metge.
Evitar l'alletament durant el tractament

S'ha notificat en algun pacient episodis de cansament durant el tractament cal tenir-ho en compte si el pacient ha de conduir o manipular maquinaria.

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir amb l'efecte del seu tractament. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Està contraindicada l'administració concomitant amb rosuvastatina inhibidors de la HMG-Co A reductasa herba de Sant Joan, rifampicina, carbamazepina, fenitoïna, rifabutina, rifapentina entre d'altres.

Quins son els efectes secundaris més comuns?

Pot provocar:

- Cansament
- Mal de cap

Si es combina amb Ribavirina pot produir anèmia.

Davant qualsevol efecte advers no descrit en aquest document, que cregui que pot estar relacionat amb la medicació, cal comunicar-ho al seu metge

Es recomana NO prendre alcohol per no augmentar la lesió del fetge

Com s'han de conservar?

Harvoni® es conserven a Tª ambient.

Recordi:

Prengui el medicament com li ha indicat el seu metge.

El tractament és personal i no l'ha de utilitzar un altra persona.

Informi al seu metge o farmacèutic si esta prenen altres medicaments.

Mantingui el medicament fora l'abast dels nens.

No utilitzi el medicament un cop superada la data de caducitat (darrer dia del mes indicat en l'envàs)

Si vol saber més pot consultar..

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

<http://www.cdc.gov/spanish/az/h.html>

Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS					
Descripción					
Forma	Color	Ranura	Longitud	Inscripciones	Presencia de dibujo
	NARANJA	NO	19,00mm	GS1 7985	NO