

NEVIRAPINA (VIRAMUNE®)

Conté el principi actiu nevirapina. Nevirapina és un inhibidor no nucleósido de la transcriptasa inversa (ITINAN). Actua bloquejant l'activitat de la transcriptasa inversa, un enzim que el VIH produeix i que li permet infectar cèl·lules en l'organisme i multiplicar-se.

A l'administrar Viramune® en combinació amb altres fàrmacs antiretrovirals, es redueix la quantitat de VIH en sang i es manté a nivells baixos. Viramune® no cura la infecció per VIH ni la SIDA, però si pot retardar el deteriorament del sistema immunitari i l'aparició de infeccions i malalties associades a la SIDA.

Com s'ha de prendre?

La dosi recomanada és de 20 ml un cop al dia, durant els primers 14 dies. Després es pren dos cops al dia. Es facilita el seu ús amb la xeringa dispensadora. Es pot prendre amb o sense aliments.

Que fer si s'oblida una dosi?

Prengui-la lo abans possible, excepte si està més propera la següent dosi que la oblidada.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

Evitar l'al·letament durant el tractament.

No prengui Viramune® si té:

- Una malaltia hepàtica greu o presenti problemes hepàtics
- Si pren hipericó o herba de Sant Joan

Si ha tingut que suspendre Viramune® per els efectes secundaris que li ha produït, no pot tornar a prendre'l.

Si atura el tractament amb Viramune® per un període superior a una setmana informi al seu metge abans de reiniciar el tractament.

Viramune® pot causar fatiga. Si se sent molt cansat eviti realitzar activitats perilloses com conduir o utilitzar màquines.

Presentacions comercials

Presentacions en el nostre centre:

Viramune® 50mg/5ml suspensió oral

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir amb l'efecte de Viramune®. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Viramune® trobem: mal de cap, diarrea, granissades, nàusees, cansament, dolor abdominal, febre, hepatitis i alteracions hepàtiques en les determinacions analítiques sanguines.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquest efectes adversos.

Conservació

Mantingui els comprimits en l'envàs original a temperatura ambient i protegides de la llum i la humitat. Manténir fora de l'abast dels nens

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l'envàs

Si vol saber més pot consultar...

<http://infosida.nih.gov/education-materials/fact-sheets/>

<http://www.gtt-vih.org/>

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

