

PEGINTERFERÓ β 1A (PLEGRIDY®)

Plegridy® conté el principi actiu Peginterferó β 1a. El peginterferó β 1a es un conjugat covalent de interferó β 1a i metoxipoliètilenglicol. El interferó β 1a es una proteïna que elabora el nostre propi organisme per protegir-nos de infeccions i malalties.


L'Esclerosi Múltiple(EM) és una malaltia crònica que afecta al sistema nerviós central. En la EM el sistema immunitari (les defenses de l'organisme) destrueix la coberta protectora (mielina) que recobreix els nervis del sistema nerviós central, aquest fet pot retardar o interrompre la transmissió de les senyals que passen a través de les cèl·lules nervioses i donar lloc als símptomes de l'EM.

L'EM es caracteritza per atacs repetitius de símptomes del sistema nerviós que son un reflex de la inflamació que té lloc en el sistema nerviós central. A aquests atacs se'ls anomena brots.

Plegridy® està indicat com a tractament modificador del curs de la EM remitent recidivant en adults. No cura la malaltia.

Com s'ha de prendre?

Plegridy® s'administra per via subcutània.



La dosi recomanada es un injectable de 125 mcg cada 2 setmanes (14 dies).

A l'iniciar el tractament es recomana fer-ho amb una dosi de 63 mcg el dia 0, augmentar a 94 mcg el dia 14 i seguir amb 125 mcg cada setmanes (14 dies).

No administrar on la pell estigui envermellida, tingui un blau o estigui dura. Canviï de lloc d'administració cada cop.

Plegridy® es conserva en el frigorífic. Tregui'l del frigorífic, 30 minuts abans d'administrar.

Que fer si s'oblida una dosi?

Administri-la lo abans possible:

- Si falten 7 o més dies fins la següent dosi programada, s'ha de administrar lo abans possible i seguir amb la pròxima dosi programada.
- i falten menys de 7 dies, s'ha d'administrar immediatament i administrar la següent dosi 2 setmanes després.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Precaucions

No administrar si té al·lèrgia a interferó, depressió greu activa o està embarassada
Les dones en edat fèrtil han d'utilitzar un mètode anticonceptiu durant el tractament.
Si es quedés embarassada durant el tractament cal informar immediatament al seu metge.
Evitar l'alletament durant el tractament.

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir amb l'efecte de Plegridy®.
No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

Els efectes secundaris més comuns son:

- Síntomes pseudogripals com mal de cap, febre, calfreds, sudoració, dolors musculars i dolors en general. Son freqüents al començament del tractament i disminueixen al llarg del tractament. Al inici del tractament prengui analgèsics (paracetamol, ibuprofeno, naproxeno etc) 30 minuts abans de la injecció, i repetir cada 6-8 hores els dos dies posteriors a l'administració.
- Eritema en el lloc de injecció.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquest efectes adversos.

Conservació

Conservi en nevera (entre 2 i 8°C).
Plegridy® es pot conservar a temperatura <25°C com a màxim 30 dies, sempre protegit de la llum.

Mantenir fora de l'abast dels nens

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.htm>

<http://www.sen.es/publico-pacientes/video-informativo/114-videos/434-e-multiple>

