

PROFILAXIS POSTEXPOSICIÓ VIH

La profilaxi post-exposició és una mesura secundària per prevenir el VIH quan la prevenció primària ha fallat. Aquesta consta en l'administració de dos medicaments:

- Raltegravir (Isentress400®)
- Emtricitavina/Tenofovir disoproxil

Són fàrmacs antiretrovirals indicats pel tractament de la infecció per VIH.

Raltegravir es un inhibidor de la integrasa. Bloqueja un enzim anomenat integrasa, implicat en una fase de la reproducció del VIH. Quan aquest enzim es bloqueja el virus no es reproduceix normalment, frenant així la propagació de la infecció.

Emtricitabina i Tenofovir disoproxil són inhibidors de la transcriptasa inversa anàleg dels nucleòsids. Els dos principis actius bloquegen l'activitat de la transcriptasa inversa, un enzim produït per el VIH que li permet infectar a les cèl·lules i fabricar més virus.

La combinació d'aquests antiretrovirals durant 4 setmanes i amb un inici el més aviat possible després de l'exposició de risc ha demostrat ser altament eficaç en la prevenció de la infecció per VIH.

Posologia

Isentress 400® s'administra un comprimit dos cop al dia, matí i nit amb o sense aliments.

Emtricitabina/ Tenofovir disoproxil s'administra un comprimit un cop al dia amb aliments, és a dir, després d'un àpat (amb l'estomac ple)

Els comprimits es prenen sencers, no es recomana mastegar, triturar o partir els comprimits.

Que fer si s'oblida de prendre una dosi?

L'ha de prendre lo abans possible. Si han passat més de sis hores esperi a la següent toma i no dobli mai la dosi. En cas de qualsevol dubte pregunti al seu metge o farmacèutic.

Precaucions

Alguns medicaments poden interferir en l'efecte de Isentress® i/o Emtricitabina/Tenofovir. No prengui cap medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar abans amb el seu metge o farmacèutic.

Les dones en edat fèrtil han de utilitzar un mètode anticonceptiu eficaç durant el tractament. Si es queda embarassada durant el tractament ha de avisar immediatament al seu metge. Evitar la lactància materna durant el tractament.

Raltegravir pot provocar mareig, si es troba marejat eviti activitats perilloses com conduir o utilitzar màquines.

Contraindicacions

Pacients amb hipersensibilitat a raltegravir.

Pacients amb:

- Insuficiència renal greu (ClCr < 30 ml/min)
- Hipersensibilitat a emtricitabina i /o tenofovir

Consulti al seu metge o farmacèutic si apareixen aquest o altres efectes.

Presentacions

Isentress® 400 mg comprimits

Emtricitabina/Tenofovir disoproxil EFG comp



Efectes secundaris

Isentress 400®

Els més freqüents son:

- Trastorns gastrointestinals (diarrea, nàusees, vòmits)
- Debilitat
- Cansament
- Mareig
- Mal de cap

Emtricitabina / Tenofovir disoproxil

Els més freqüents son:

- Al·lèrgia
- Disminució de la quantitat de fosfat en sang-
- Augment de la glucosa (sucre), dels triglicèrids i de la bilirubina en sang
- Insomni, malsons, mal de cap i mareig
- Trastorns gastrointestinals (diarrea, vòmits, nàusees i dolor abdominal)
- Trastorns de la pell (erupcions, picor, hiperpigmentació)



Consulti al seu metge o farmacèutic si apareixen aquest o altres efectes secundaris.

Conservació

Mantingui els comprimits en l'envàs original a temperatura ambient i protegides de la llum i la humitat. Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<http://infosida.nih.gov/education-materials/fact-sheets/>

<http://www.gtt-vih.org/>

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>