

EMTRICITABINA/ RILPIVIRINA/ TENOFOVIR ALAFENAMIDA (ODEFSEY®)

Es un medicament que conté tres principis actius: emtricitabina (200 mg), rilpivirina (25 mg) i tenofovir alafenamida (25 mg).

Els tres principis actius bloquegen l'activitat de la transcriptasa inversa, un enzim produït per el VIH que li permet multiplicar-se i infectar a les cèl·lules

Odefsey® manté la quantitat de VIH en la sang a nivells baixos això millora el sistema immunitari i disminueix el risc de desenvolupar malalties associades al VIH.

Com s'ha de prendre?

Odefsey® s'administra per via oral un comprimit al dia **amb un àpat**, s'ha d'empassar **sencer** amb un got d'aigua.

Cal prendre el medicament diàriament, a la mateixa hora i no saltar-se cap dosi.

Que fer si s'oblida una dosi?

Si es dona compte **en les 12 hores** posteriors a l'hora habitual que normalment el pren, prengui el comprimit lo abans possible amb algun aliment.

Si es dona compte 12h o més després de la hora que normalment el pren, no prengui la dosi oblidada. Espera i prengui la següent dosi, amb aliments a la hora habitual.

No prengui mai una dosi doble per compensar l'oblit.

Si **vomita** dins de les 4 hores següents a l'administració d' Odefsey® s'ho ha de tornar a prendre. Si vomita després de 4 hores de prendre Odefsey® no el torni a prendre fins la següent dosi pauta de forma regular.

En cas de qualsevol dubte pregunta al seu metge o farmacèutic.

Precaucions

Si té hipersensibilitat a emtricitabina, rilpivirina i tenofovir
En cas de insuficiència hepàtica moderada-greu.

Es recomanen mesures anticonceptives eficaces durant el tractament.

Si es quedés embarassada durant el tractament cal informar immediatament al seu metge.
Evitar l'alletament durant el tractament

S'ha notificat en algun pacient episodis de cansament, mareig i somnolència durant el tractament amb Odefsey®
Cal tenir-ho en compte si el pacient ha de conduir o manipular maquinària.

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir amb l'efecte de Odefsey®.

No es recomana el tractament amb Odefsey® i antiepilèptics (carbamazepina, oxcarbamazepina, fenobarbital i fenitoïna), rifabutina, rifampicina i rifapentina, inhibidors de la bomba de protons (omeprazol, lansoprazol, pantoprazol...), dexametasona (excepte com a tractament de dosi única), herba de Sant Joan. Recordi que aquesta llista no és exclouent consulti al seu metge o farmacèutic.

No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic

Efectes secundaris

Els més freqüents són: nàusees, mareig, mal sons, mal de cap, diarrea, insomni, cansament, alteracions estat d'ànim, flatulències, diarrea, mal d'estómac, neutropènia, hiperlipèmia.

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquest efectes adversos.

Presentacions comercials

Odefsey® 200mg/25 mg/25 mg comprimit recobert amb pel·lícula.
Conté lactosa com excipient.

Conservació

Mantingui els comprimits en l'envàs original a temperatura ambient i protegides de la llum i la humitat.
Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l'envàs

Si vol saber més pot consultar...

<http://infosida.nih.gov/education-materials/fact-sheets/>
<http://www.gtt-vih.org/>



Forma farmacéutica: COMPRIMIDOS
Descripción

Forma	Color	Ranura	Longitud	Inscripciones	Presencia de dibujo
	GRIS	NO	15,00mm	GSI 255	NO