

SOMATROPINA (HUMATROPE®)

La somatropina és una hormona del creixement necessària per un creixement adequat dels diversos teixits corporals i per una adequada distribució de la massa muscular i del teixit gras.


Com s'ha de prendre?

S'administra amb una injecció subcutània (per sota la pell). El metge li indicarà la dosi en funció del seu pes o superfície corporal i la duració del tractament.

S'ha d'administrar per la nit. El lloc d'injecció sol ser: braços, glutis i abdomen (al voltat del melic). S'ha d'alternar el lloc d'injecció per evitar la lipoatrofia.

Recordi rentar-se les mans i la pell del punt d'injecció i desinfectar amb un cotó impregnat amb alcohol abans de la punció.

Abans de la punció s'ha de fer la reconstitució on es barreja la pols amb el dissolvent. La solució ha de ser transparent i amb absència de partícules.



Que fer si oblida una dosi?

Si oblida una dosi, administri la següent injecció a la hora corresponent del dia següent. MAI injecti una dosi doble. Ha de registrar les dosis oblidades i informar al metge.

Precaucions

Si es produeix sangrat al aplicar la hormona, comprimeix la zona durant uns minuts,. Consulti amb el metge si es repeteix varis cops.

Abans d'administrar somatropina ha d'informar al metge si pateix hipersensibilitat coneguda a la somatropina, una enfermetat crítica, insuficiència respiratòria aguda, hiperglucèmia o diabetis i retinopatia proliferativa. També en el cas de que rebi un tractament per hiper o hipotiroïdisme, insuficiència renal crònica o tractament amb corticoides. Si pateix o es troba en tractament de neoplàsies actives o si ha tingut una lesió intracraneal o si està embarassada.

Interaccions

Informi al seu metge o farmacèutic de tota la medicació que pren. Sobretot si pren tractament per la diabetis, trastorns de glàndula tiroïdes, hormones sexuals, corticoides, anticonvulsionants i ciclosporina.

Efectes adversos

Envermelliment i picor en la zona d'injecció, lipoatrofia localitzada i formació d'anticossos.

Avisar al metge si presenta reaccions al·lèrgiques com reacció cutània, picor o urticària, inflamació de la cara llavis o llengua, cefalea intensa o repetida, edemes o rampes severes, problemes visuals, nàusees o vòmits, dolors de maluc o genoll.

Conservació

- Abans de reconstituir:

No congelar. Conservar en nevera entre 2-8°C. A < 25°C màxim de 6 mesos.

- Després de reconstituir:

No congelar. Conservar en nevera entre 2-8°C durant 24 h.

Conservar dins del embalatge per protegir de la llum. No utilitzi aquest medicament si conté espuma o no és transparent.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001176.htm>

