

SOMATROPINA (OMNITROPE®)

La somatropina o hormona del creixement és necessària per un adequat creixement dels diversos teixits corporals així com per una adequada distribució de la massa muscular i teixit gras.

Posologia:

La somatropina s'ha d'administrar únicament mitjançant injecció subcutània. El seu metge li indicarà la dosi en funció del seu pes o de la superfície corporal i la duració del tractament.


Com s'ha d'aplicar l'hormona del creixement?

S'ha d'administrar **PER LA NIT**. El lloc d'injecció és subcutani: braços, glutis i abdomen (al voltant del melic)

Alternar el lloc d'injecció per evitar la lipoatrofia. Recorda rentar-se les mans i netejar-se la pell en el pun de la injecció amb un cotó impregnat amb alcohol abans d'infectar-se l'hormona.

Presentacions al centre:

Omnitrope 10 mg/1,5 ml solució injectable



Què fer si...?

- Si s'ha oblidat d'administrar la dosi, posis la següent injecció a l'hora corresponent del dia següent. **No s'injecti una dosi doble.**
S'han de registrar les dosis oblidades i informar al metge el dia de la visita.
Pot continuar el tractament si té febre, pren antibiòtics, vacunes o un altre tipus de medicament. En cas greu, consultar al metge.
- Si es produeix sagnat al aplicar l'hormona assecat i pressionar la zona durant uns minuts. Consultar el metge si es repeteix varies vegades.
- **Si la hormona es congela no serveix.**
- Si se'n va de vacances ha de continuar amb el tractament. Asseguri's de mantenir la medicació a la temperatura indicada en un bol o caixa de transport amb gel i si viatja a l'estranger emporti l'informe mèdic.

Abans d'administrar l'hormona del creixement ha d'avisar el seu metge si....

Pateix d'hipersensibilitat coneguda a la somatropina, una malaltia crítica, insuficiència respiratòria aguda, hiperglicèmia o diabetis, retinopatia proliferativa, si rep tractament per hiper/hipotiroïdisme, insuficiència renal crònica, tractament amb corticoides, si pateix o està amb tractament de neoplàsies actives o si te o ha tingut una lesió intracraneal subjacent i està embarassada. No hi ha estudis clínics en dones en període de lactància.

Interaccions

Informe al seu metge o farmacèutic de tota la medicació que està prenent.

Sobretot si utilitza:

- Tractament per la diabetis
- Trastorns de la glàndula tiroides
- Hormones sexuals
- Corticoides
- Anticonvulsivants
- Ciclosporina

Efectes adversos:

En nens:

- Envermelliment, picor o dolor temporal en el lloc d'injecció
- Dolor articular

En adults:

- Dolor articular
- Retenció de líquids
- Formigueig, adormiment
- Rigidesa braços i cames, dolor muscular
- Dolor o coïssor al braç o a l'avantbraç

Trucar al metge si...

Presenta reaccions al·lèrgiques com reacció cutània, picor o urticària, inflació de la cara, llavis o llengua, mal de cap intens o repetit, edema o rampes fortes,

Conservació:

Abans del primer ús

No congelar.

Conservar en nevera entre 2°C y 8°C.

Després del primer ús

Conservar el cartutx dins la ploma

No congelar.

Conservar en nevera entre 2°C y 8°C màxim 28 dies.

No utilitzi aquest medicament si la mescla conté espuma o no és transparent.

Mantingui el medicament fora de l'abast dels nens

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001176.htm>

