

TETRAHIDROCANNABINOL/ CANNABINOL (SATIVEX®)

Sativex és un medicament que conté tetrahidrocannabinol i cannabinol i s'utilitza per aliviar la espasticitat associada a la esclerosis múltiple.

Posologia

Es gradual fins assolir la dosi, cal individualitzar dosi seguint la pauta de informació al pacient.
Un cop establerta la dosi diària eficaç si un dia es troba pitjor pot augmentar la dosi en una polvorització al dia.
Màxim 12 polvoritzacions/dia

Administració

Sublingual, mantenir l'envàs en posició vertical i col·locar la boquilla sota la llengua o cap a la cara interna de la galta.

No efectuar la polvorització prop de la gola ni en el nas

Variar de lloc d'aplicació

Abans primera administració:

- Agitar el vial suaument i retirar el caputxó protector
- Col·locar el vial entre els dits polze i cor i situar el índex sobre la boquilla
- Purgar el polvoritzador sobre un mocador fins observar una pols fina

Primera administració:

- Agitar el vial suaument i retirar el caputxó protector
- Col·locar el vial entre els dits polze i cor i situar el índex sobre la boquilla
- En posició vertical col·locar la boquilla sota la llengua o cap a la cara interna de la galta pressionar fermement la boquilla
- Si s'han d'administrar més polvoritzacions deixar passar 15' entre cada polvorització
- Tapar amb el caputxó protector

Que fer si s'oblida de prendre una dosis?

Efectuï una polvorització lo abans possible, no administri dos polvoritzacions per compensar la dosi oblidada.

En cas de qualsevol dubte pregunti al seu metge o farmacèutic.

Precaucions

Conté alcohol.

No es recomana el consum de begudes alcohòliques durant el tractament amb Sativex

Contraindicacions

Pacients amb:

- hipersensibilitat a cannabinoides
- antecedents personals o familiars d'esquizofrènia o altra malaltia psiquiàtrica greu excepte depressió associada a la malaltia adjacent

Efectes secundaris

Molt freqüent: mareig lleu o moderat durant les primers setmanes de tractament, cansament.

Freqüent: anorèxia, augment gana, depressió, desorientació, dissociació, amnèsia, alteració equilibri, alteració atenció, disàrtria, disgeusia, letargia, alteració memòria, somnolència, visió borrosa, vertigen, estrenyiment, diarrea, boca seca, ulceració boca, nàusees, vòmits, dolor boca, estenia, malestar general, caigudes.

Poc freqüents: faringitis, al·lucinacions, síncope, palpitations, taquicàrdia, hipertensió, irritació gola, dolor abdominal, irritació zona aplicació

Conservació

Abans d'obrir conservar en nevera.

Un cop obert conservar fins a 6 setmanes fora de la nevera a T^a < 25°C.

Anotar en l'envàs la data d'obertura.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l'envàs.

Si vol saber més pot consultar...

<http://www.sen.es/publico-pacientes/video-informativo/114-videos/434-e-multiple>

Recordi

Prengui el medicament com li ha indicat el seu metge.

El tractament és personal i no l'ha de utilitzar un altra persona.

Informi al seu metge o farmacèutic si esta prenen altres medicaments.

Mantingui el medicament fora l'abast dels nens.

