

TERIFLUNOMIDA (AUBAGIO®)

Es un medicament que conté el principi actiu Teriflunomida i s'utilitza per tractar l'Esclerosi Múltiple Remitent Recurrent en pacients adults.

L'Esclerosi Múltiple és una malaltia crònica que afecta al sistema nerviós central. En la Esclerosi Múltiple el sistema immunitari (les defenses de l'organisme) destrueix la coberta protectora (mielina) que recobreix els nervis del sistema nerviós central, aquest fet pot retardar o interrompre la transmissió de les senyals que passen a través de les cèl·lules nervioses i donar lloc als símptomes de l'Esclerosi Múltiple.

L'Esclerosi Múltiple es caracteritza per atacs repetitius de símptomes del sistema nerviós que son un reflex de la inflamació que té lloc en el sistema nerviós central. A aquests atacs se'ls anomena brots.

Els símptomes dels brots varien de un pacient a un altre, però generalment consisteixen en: dificultat per caminar, pèrdua de sensibilitat o formigueig, problemes de visió i trastorns en l'equilibri.

Aubagio® està indicat en monoteràpia com a tractament modificador del curs de la malaltia. No cura la malaltia però ajuda a reduir la lesió de les cèl·lules nervioses al dificultar que el sistema immunitari ataquï al sistema nerviós central. Al deixar de prendre el medicament augmenten les defenses i ja no tenim l'efecte terapèutic.

Posologia

Aubagio® s'administra per via oral un comprimit al dia de 14 mg amb o sense aliments, s'ha d'empassar sencera amb un got d'aigua.

Cal prendre el medicament diàriament, a la mateixa hora i no saltar-se cap dosi. No deixi de prendre Aubagio® sense abans comentar-li al seu metge.

Que fer si s'oblida de prendre una dosi?

En el cas que s'oblidi una dosi ha de continuar amb la següent dosi tal com ho te prescrit. No prengui una dosi doble per compensar. En cas de qualsevol dubte preguntí al seu metge o farmacèutic.

Precaucions

No hi ha estudis de tractament en pacients de 65 anys o més ni en menors de 18 anys

Aubagio® conté lactosa, pacients amb intolerància hereditària a galactosa, insuficiència de lactasa de Lapp o malabsorció de glucosa o galactosa no han de prendre aquest medicament.

No administrar en pacients sotmesos a diàlisi ni en pacients amb insuficiència hepàtica greu.

Descartar l'embaràs abans de iniciar el tractament. Aubagio® està contraindicat en dones embarassades o en edat fèrtil que no utilitzin mesures anticonceptives fiables.

No administrar durant l'al·letament, ni en pacients amb estadis de immunodeficiència greu

Contraindicada l'administració de Aubagio® en pacients amb:

- una infecció activa greu
- amb anèmia, leucopènia, neutropènia o trombocitopènia significativa
- hipoproteïnèmia greu

Caldrà controlar la tensió arterial abans i durant el tractament amb Aubagio® així com realitzar control analítics.

Efectes secundaris

Els efectes secundaris més freqüents de Aubagio® són: mal de cap, diarrea, nàusees, elevació de l'alanina aminotransferasa i alopecia.

Interaccions

Alguns fàrmacs poden interaccionar amb Aubagio®. Informi al seu metge.

Conservació

Mantingui els comprimits en l'envàs original a temperatura ambient i protegides de la llum i la humitat. Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l'envàs

Si vol saber més pot consultar...

<http://www.sen.es/publico-pacientes/video-informativo/114-videos/434-e-multiple>

<https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html>

