

Ciclosporina 1mg/ml col·liri (IKERVIS®)

Ikervis® conté el principi actiu ciclosporina.

Ikervis® és un antiinflamatori. Està indicat pel tractament de la queratitis greu en pacients adults amb xeroftalmia que no ha millorat amb el tractament amb llàgrimes artificials.

Com s'ha d'administrar?

Ikervis® s'administra per via oftàlmica. S'ha de posar 1 gota, 1 vegada al dia abans d'anar a dormir, en cada ull afectat.

S'han d'extremar les precaucions per evitar contaminar el col·liri. S'ha de rentar les mans abans de l'administració.

Retirar les lents de contacte abans de l'administració.

Agitar suaument l'envàs abans de cada administració.

1. Inclinar el cap enrere.
2. Tirar de la parpella inferior amb un dit índex i mirar cap a dalt.
3. Instil·lar una gota en el sac conjuntival, mantenint l'envàs vertical amb el goter cap a baix.
4. Una vegada aplicada la gota, parpellejar repetides vegades per distribuir el col·liri. Després es recomana pressionar el sac lacrimal durant un minut i tancar els ulls durant 2 – 3 minuts.

Si s'estan utilitzant altres medicaments oftàlmics, es recomana distanciar les administracions com a mínim 15 minuts, administrant Ikervis® en l'últim lloc.

Que fer si s'oblida una dosi?

Administrar Ikervis® a la següent dosi, a l'hora habitual. No duplicar la següent dosi ni administrar més de 1 gota en cada ull al dia.

Precaucions

La ciclosporina presenta efectes immunosupressors, pel que podria agreujar les infeccions oftàlmiques. El seu ús està contraindicat en pacients amb infecció oftàlmica activa o sospita de la mateixa.

Contraindicat si hipersensibilitat a ciclosporina o a qualsevol component del medicament.

Pot afectar a la capacitat per conduir o utilitzar maquinària.

Les dones en edat fèrtil haurien d'utilitzar anticonceptius eficaços durant el tractament. Consulti al metge si es queda embarassada.

Es recomana valorar la necessitat de suspendre la lactància o evitar l'administració en base als beneficis per la mare i els riscos pel lactant.

Interaccions amb altres medicaments

Alguns medicaments poden interferir amb l'efecte de Ikervis® com els corticoides oftàlmics, que poden produir risc de potenciació de la immunosupressió local a l'associar col·liris amb corticoides.

No prengui cap altre medicament sense consultar el seu metge o farmacèutic.

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents associats a Ikervis® trobem:

- Eritema palpebral
- Llagrimeig
- Hiperèmia conjuntival
- Visió borrosa
- Edema palpebral
- Irritació ocular
- Dolor ocular

Consulti al seu metge o farmacèutic si presenta algun d'aquest efectes adversos o d'altres.

Conservació

No congelar. Després d'obrir les bossetes d'alumini, s'han de mantenir els envasos unitaris dins d'elles per protegir-los de la llum i evitar l'evaporació.

S'ha de rebutjar immediatament després del seu ús qualsevol envàs unitari individual obert amb restes de col·liri. Cada envàs unitari és d'un sol ús i conté medicació suficient per administrar 1 gota en 2 ulls (si els 2 ulls estan afectats). No guardar el sobrant perquè perd l'esterilitat en obrir l'envàs.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l'envàs. La data de caducitat és l'últim dia del mes que s'indica.

Si vol saber més pot consultar...

https://cima.aemps.es/cima/dochtml/p/115990001/P_115990001.html

<https://www.lagrimasartificiales.net/ikervis/>

