

FREMANEZUMAB (AJOVY®)

Fremanezumab és un medicament antimigranyós, un anticòs monoclonal humanitzat que s'uneix al receptor del pèptid relacionat amb el gen de la calcitonina (CGRP). Aquest receptor es troba localitzat en llocs rellevants en la fisiopatologia de la migranya, com en el gangli del trigènim.

El CGRP és un neuropèptid que modula les senyals nociceptives i un vasodilatador que s'ha associat a la fisiopatologia de la migranya. S'han observat que els seus nivells augmenten durant la migranya i disminueixen quan s'alivia. Fremanezumab presenta una alta especificitat per CGRP i no s'uneix a membres de la seva família estretament relacionats.

Està indicat com a profilaxia de la migranya en adults amb, com a mínim, 4 dies de migranya al mes. Està finançat pel sistema públic en pacients amb: 8 dies de migranya/mes (migranya episòdica de freqüència alta i migranya crònica) i que hagin fracassat a 3 o més tractaments previs durant 3 mesos, com a mínim.

Com s'ha d'administrar?


Fremanezumab s'administra per via subcutània (sota la pell). No administrar on la pell estigui envermellida, tingui un blau o estigui dura.

La injecció es pot administrar en l'abdomen, cuixa o en la zona externa de la part superior dels braços.

En adults es disposa de dos opcions de pauta posològica:

- 225 mg una vegada al mes (pauta mensual) o,
- 675 mg cada tres mesos (pauta trimestral)

Al canviar de pauta posològica, la primera dosi de la nova pauta s'ha d'administrar en la següent data d'administració prevista de la pauta anterior.



Què fer si s'oblida una dosi?

Ha d'administrar-la lo abans possible i contactar amb el metge que li donarà una nova pauta d'administració.

Precaucions

Evitar el seu ús durant l'embaràs. Consultar amb el metge sobre la utilització de fremanezumab durant l'al·letament. No s'ha avaluat la seva eficàcia i seguretat en pacients amb certes malalties cardiovasculars.

Interaccions amb altres medicaments

No s'ha observat cap interacció significativa. No prengui cap altre medicament, suplement dietètic o producte natural sense consultar al seu metge o farmacèutic.

Presentacions comercials

Presentacions al nostre centre:

- Ajovy® 225 mg xeringa precarregada

Efectes secundaris

Entre els efectes adversos més freqüents trobem:

- Trastorns del sistema immunològic: reaccions d'hipersensibilitat, erupcions exantemàtiques, inflamació, edema cutània i urticària.
- Trastorns gastrointestinals: restrenyiment, còlics
- Trastorns de la pell i del teixit subcutani: prurit
- Trastorns musculoesquelètic i del teixit conjuntiu: espasme muscular
- Trastorns generals i alteracions en el lloc d'administració: dolor en el punt d'injecció.

Conservació

Conservació en nevera (entre 2 i 8 °C).

Conservar les xeringues precarregades en l'embalatge exterior per protegir-les de la llum. Ajoyv[®] pot conservar-se sense refrigerar durant un màxim de 24 hores a una temperatura de fins 25°C. Ajoyv[®] s'ha de rebutjar si ha estat més de 24 hores fora de la nevera.

No congelar i protegir de la llum.

Mantenir fora de l'abast dels nens.

Caducitat

No utilitzar després de la data de caducitat indicada en l'envàs

Si vol saber més pot consultar...

https://cima.aemps.es/cima/dochtml/p/1191358001/P_1191358001.html

