

## Informació i seguiment BCG tractament mensual

---

DATA	TRACTAMENT	NÚM. DOSI	SEGUIMENT INFERMERIA

### **INDICACIONS:**

#### **Abans del tractament:**

- Dutxa o higiene dels genitals.
- Quatre hores abans del tractament disminuir al màxim el consum de líquids (pot esmorzar).
- Orinar just abans d'aplicar el tractament.

#### **Després del tractament:**

- No ha de prendre líquids ni orinar durant 1,5-2 h per tal de mantenir la medicació a la bufeta.
- No estar immobilitzat; cal estirar-se al llit durant 1 h i anar canviant de posició cada 15 minuts, alternant costat dret, panxa enlaire i costat esquerre. La resta de temps pot caminar, estar assegut.
- Un cop passades 2 h de l'administració del tractament, reiniciar la ingesta d'aigua. És recomanable prendre 1'5 l – 2 l d'aigua en 24 h.

#### **Durant les 6 h posteriors al tractament:**

- Orinar assegut.
- Rentar-se les mans i els genitals després d'orinar.
- Tirar dos vasos de lleixiu al wc per neutralitzar el medicament, baixar la tapa i deixar-lo reposar durant 15 minuts abans de buidar la cisterna.
- En el cas que la roba es taqui d'orina, rentar-la a part en abundant aigua i sabó.

**Es desaconsella mantenir relacions sexuals durant la setmana posterior a l'administració del tractament, i en cas de mantenir-ne, cal utilitzar preservatiu.**

**POSSIBLES EFECTES NO DESITJATS:**

- Miccions freqüents, amb sensació de cremor durant la micció, que poden mantenir-se durant el 1r i 2n dia.
- Restes de sang en orina.
- Simptomatologia gripal: febre, esgarrifances, dolors musculars, cansament, nàusees o vòmits, cefalea.

En aquestes situacions és important beure abundantment aigua, reposar al llit i prendre paracetamol o aspirina per tractar el dolor o la febre.

Si **febre > 39°C durant més de 12 hores, febre moderada (38°C) durant més de dos dies** o algun **signe de reacció al·lèrgica (com dificultat per respirar, sibilàncies, rash o edema de la cara)**, ha d'anar a urgències.