

Informació i seguiment Mitomicina 6 setmanal

| DATA | TRACTAMENT | NÚM. DOSI | SEGUIMENT INFERMERIA |
|------|------------|-----------|----------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

INDICACIONS:

Abans del tractament:

- Dutxa o higiene dels genitals.
- Quatre hores abans del tractament disminuir al màxim el consum de líquids (pot esmorzar).
- Orinar just abans d'aplicar el tractament.

Després del tractament:

- No ha de prendre líquids ni orinar durant 1,5-2 h per tal de mantenir la medicació a la bufeta.
- No estar immobilitzat; cal estirar-se al llit durant 1 h i anar canviant de posició cada 15 minuts, alternant costat dret, panxa enlaire i costat esquerre. La resta de temps pot caminar, estar assegut.
- Un cop passades 2 h de l'administració del tractament, reiniciar la ingesta d'aigua. És recomanable prendre 1'5 l - 2 l d'aigua en 24 h.

Durant les 6 h posteriors al tractament:

- Orinar assegut.
- Rentar-se les mans i els genitals després d'orinar.
- Tirar dos vasos de lleixiu al wc per neutralitzar el medicament, baixar la tapa i deixar-lo reposar durant 15 minuts abans de buidar la cisterna.
- En el cas que la roba es taqui d'orina, rentar-la a part en abundant aigua i sabó.

Es desaconsella mantenir relacions sexuals durant la setmana posterior a l'administració del tractament, i en cas de mantenir-ne, cal utilitzar preservatiu.

POSSIBLES EFECTES NO DESITJATS:

- Miccions freqüents o doloroses.
- Hematúria.
- Picors i/o descamació dels palmells de les mans.
- Erupcions cutànies.

Si aquests efectes no desitjats duren **més de dos dies** o presenta **febre > 38°C** ha d'anar a urgències.