




## **Catèter amb reservori subcutani (PORT -A- CATH)**

### **Què és?**

El catèter amb reservori subcutani és un petit dispositiu (reservori) rodó metàl·lic amb una membrana central de silicona connectada a un tub fi (catèter que s'introdueix dins de les venes profundes del cos). El catèter no es veu, atès que es col·loca sota la pell a prop de la clavícula. No necessita molt de manteniment i es redueix el risc d'infeccions.



### **Per a què serveix?**


Moltes vegades és necessari accedir a una vena de forma senzilla i poc dolorosa per obtenir mostres de sang o bé per administrar medicació de forma contínua. El reservori subcutani pot ser una bona solució en els següents supòsits:

- Quan es necessita administrar tractaments de forma contínua durant bastant de temps i no es vol lesionar les venes.
- Quan els tractaments són molt irritants per a les venes perifèriques (les externes que veiem) i cal una vena més grossa i profunda (les internes no es veuen).

### **Com es col·loca?**

Cal fer-ho al quiròfan, amb anestèsia local i la intervenció dura aproximadament una hora.

- És un procés ambulatori.
- S'administra un antibiòtic endovenós de forma preventiva.
- Mentre es realitza la tècnica cal estar estirat en una camilla i quiet.
- El metge farà una petita incisió a la pell per introduir-vos el catèter que després es tancarà amb punts reabsorbibles. La tècnica es farà mitjançant escòpia, per localitzar el lloc de col·locació.
- Portareu unes gasses estèrils tapant la ferida que haureu de canviar per unes de netes, al cap de 2 dies o abans, si estan mullades o tacades.
- Quan us col·loquin el catèter notareu que us toquen però no sentireu dolor.



### **Preparació abans d'entrar a quiròfan.**

- Cal estar en dejú, mínim 4 hores abans.
- Us heu de treure les joies, el rellotge i la dentadura postissa.
- Elimineu l'esmail de les ungles.
- Dutxa general i la pell neta.

### **Com es cuida?**

Un cop col·locat el catèter:

- Podeu fer les activitats habituals: caminar, menjar i treballar si no teniu molèsties.
- Fins passats dos dies no us heu de mullar la ferida.
- Als dos dies us podeu dutxar i rentar la ferida. Procureu que quedi ben seca. Restes de dies: dutxa diària o rentat de la ferida amb aigua i sabó, que quedi ben seca i deixada a l'aire.
- Ensenyeu la ferida al metge/essa el dia de la visita.

### **En cas de dolor?**

Si a casa teniu dolor podeu prendre un calmant suau (paracetamol...).

### **Heu d'anar a urgències en cas de:**


- Febre superior a 38°.
- Dolor a la zona de la ferida.
- Supuració, envermelliment o enduriment de la ferida.



## **Catéter con reservorio subcutáneo (PORT -A- CATH)**

### **¿Qué es?**

El catéter con reservorio subcutáneo es un pequeño dispositivo (reservorio) redondo metálico con una membrana central de silicona conectada a un tubo fino (catéter que se introduce dentro de las venas profundas del cuerpo). El catéter no se ve, ya que se coloca debajo de la piel cerca de la clavícula. No necesita mucho mantenimiento y se reduce el riesgo de infecciones.



### **¿Para qué sirve?**


Muchas veces es necesario acceder a una vena de forma sencilla y poco doloroso para obtener muestras de sangre o bien para administrar medicación de forma continua. El reservorio subcutáneo puede ser una buena solución en los siguientes supósitos:

- Cuando se necesita administrar tratamientos de forma continua durante bastante tiempo y no se quiere lesionar la venas.
- Cuando los tratamientos son muy irritantes para las venas periféricas (las externas que vemos) y hace falta una vena más grande y profunda (las internas no se ven).

### **¿Cómo se coloca?**

Hace falta hacerlo en el quirófano, con anestesia local, y la intervención dura aproximadamente una hora.

- Es un proceso ambulatorio.
- Se administra un antibiótico endovenoso de forma preventiva.
- Mientras se realiza la técnica se tiene que estar estirado y quieto en una camilla.
- El médico hará una pequeña incisión en la piel para introducirle el catéter que después se cerrará con puntos reabsorbibles. La técnica se hará mediante escopia, para localizar el lugar de colocación.
- Llevará gasas estériles tapando la herida que se tendrá que cambiar por unas limpias, al cabo de 2 días o antes, si están mojadas o manchadas.
- Cuando le coloquen el catéter notará que le tocan pero no tendrá dolor.



### **Preparación antes de entrar en quirófano:**

- Tiene que estar en ayunas, mínimo 4 horas antes.
- Quítese las joyas, el reloj y la dentadura postiza.
- Elimine el esmalte de las uñas.
- Ducha general y la piel limpia.

### **¿Cómo se cuida?**

Una vez colocado el catéter:

- Puede hacer las actividades habituales: andar, comer y trabajar si no tiene molestias.
- Hasta pasados dos días no se moje la herida.
- A los dos días se puede duchar y lavar la herida. Procure que quede bien seca. Resto de días: ducha diaria o lavado de la herida con agua y jabón, que quede bien seca y dejada al aire.
- Enseñar la herida al médico el día de la visita.

### **¿En caso de dolor?**

Si en casa tiene dolor puede tomar un calmante suave (paracetamol...).

### **Tiene que ir a urgencias en caso de:**

- Fiebre superior a 38°.
- Dolor en la zona de la herida.
- Supuración, enrojecimiento o endurecimiento de la herida.