

Nombre: Apellido:

Instilación	Día	Hora

Atención telefónica durante todo el tratamiento:

93 811 65 23

Horario:

De lunes a viernes de 8 a 17h.
Si necesita ser atendido fuera de este horario o durante el fin de semana, tendrá que dirigirse al Servicio de Urgencias del Hospital.

No dude en ponerse en contacto con nosotros si le surge cualquier duda.

**Hospital Residència Sant Camil
Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf**



Guía del paciente: Tratamiento con ImmuCyst BCG



El objetivo de esta guía es ayudarle a entender su tratamiento con ImmuCyst BCG.

Si le han practicado una biopsia o una resección transuretral de tumor vesical, su médico le ha prescrito esta medicación para evitar que reaparezca la enfermedad.



Antes de someterse al tratamiento

- No tome líquidos 4 horas antes de que le administren el medicamento.
- Intente orinar antes de someterse al tratamiento para tener la vejiga vacía.

¿Cómo le realizarán el tratamiento?

- El tratamiento con ImmuCyst BCG se llevará a cabo en el Hospital de Día del Hospital Sant Camil.
- El personal de enfermería le insertará un catéter en la vejiga de la orina, a través del cual se le administrará el medicamento. A continuación, se le retirará la sonda y podrá irse a casa. Este procedimiento se llama instilación.
- Es posible que al retirar la sonda haya pequeñas pérdidas, por este motivo es conveniente que traiga una compresa absorbente.

Después del tratamiento

- Una vez retirada la sonda es muy importante que el medicamento esté dentro de la vejiga durante aproximadamente dos horas.
- Para que el tratamiento se distribuya correctamente por toda la vejiga es recomendable estar estirado y realizar cambios posturales poco a poco.
- Pasadas las dos horas es necesario que beba líquidos en abundancia para orinar con frecuencia, y así evitar molestias.
- Durante las 6 horas siguientes iniciará la expulsión del medicamento y deberá:
 - Orinar sentado
 - Tirar una taza de lejía en el WC, y dejarla reposar durante 15 minutos antes de vaciar la cisterna. De esta manera se neutralizará el medicamento
 - Lavarse las manos y los genitales con agua y jabón
- Si tiene relaciones sexuales deberá utilizar preservativo durante toda la semana posterior al tratamiento.
- Mientras dure el tratamiento, es recomendable evitar el embarazo.

Posibles efectos adversos

Durante los primeros días después de la aplicación del medicamento pueden aparecer algunos efectos secundarios:

- Micciones frecuentes o dolorosas
- Aparición de sangre en la orina
- Síntomas gripales (fiebre, dolor muscular o de cabeza, o escalofríos)

Es necesario que se ponga en contacto con su médico o el Hospital de día si:

- Los efectos secundarios anteriormente descritos duran más de 2 días
- Presenta fiebre alta (más de 38º)
- Presenta problemas respiratorios, urticaria, o se nota la cara inflamada.

Controles

Después del tratamiento su médico le programará algunas de estas pruebas:

- Citoscopia
- Ecografía
- Radiografía
- Citología de la orina: análisis de orina que deberá hacerse tres días seguidos, dos semanas antes de la citoscopia .

Su médico le indicará que deberá administrar 3 dosis más semanales de BGC, y repetir periódicamente las pruebas anteriormente citadas.