

Nom:  Cognom:

Instil·lació	Dia	Hora



**Atenció telefònica durant tot el tractament:**

93 811 65 23

**Horari:**

De dilluns a divendres de 8 a 17h.

En cas de necessitar ser atès fora d'aquest horari o en cap de setmana, haurà de dirigir-se al Servei d'Urgències de l'Hospital.

No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per qualsevol dubte que li pugui sorgir.

**Hospital Residència Sant Camil  
Consorti Sanitari Alt Penedès-Garraf**



# Guia del pacient: Tractament amb ImmuCyst BCG



L'objectiu d'aquesta guia és ajudar-lo a entendre el seu tractament amb ImmuCyst BCG.

Si li han practicat una biòpsia o una resecció transuretral de tumor vesical, el seu metge li ha prescrit aquesta medicació per tal d'evitar que torni a aparèixer la malaltia.

## Abans de fer-se el tractament

- **No prengui líquids 4 hores abans** de què li administrin el medicament.
- **Intenti orinar** abans de fer-se el tractament per tal de tenir la bufeta buida.

## Com es farà el tractament?

- El tractament amb ImmuCyst BCG es durà a terme a l'**Hospital de Dia** de l'Hospital Residència Sant Camil.
- El personal d'infermeria li inserirà un catèter a la bufeta de l'orina a través del qual s'administrarà el medicament. Tot seguit se li retirarà la sonda i podrà marxar a casa. Aquest procediment rep el nom d'instil·lació.
- És possible que al retirar la sonda hi hagi petites pèrdues, per aquest motiu és convenient que porti una compresa absorbent.

## Després del tractament

- Un cop retirada la sonda és molt important que el medicament estigui dins de la bufeta durant dues hores aproximadament.
- Perquè el tractament es distribueixi correctament per tota la bufeta és recomanable estar estirat i realitzar canvis posturals poc a poc.
- Passades les dues hores cal que begui líquids en abundància per tal d'orinar amb freqüència, i així evitar molèsties.
- Durant les 6 hores següents iniciarà l'expulsió del medicament i haurà de:
  - Orinar assegut
  - Tirar una tassa de lleixiu al WC, i deixar-lo reposar durant 15 minuts abans de buidar la cisterna. D'aquesta manera es neutralitzarà el medicament
  - Rentar-se les mans i els genitals amb aigua i sabó
- Si té relacions sexuals haurà d'utilitzar preservatiu durant tota la setmana posterior al tractament.
- Mentre duri el tractament, és recomanable evitar l'embaràs.

## Possibles efectes adversos

Durant els primers dies després de l'aplicació del medicament poden aparèixer alguns efectes secundaris:

- Miccions freqüents o doloroses
- Aparició de sang a l'orina
- Síntomes gripals (febre, mal de cap, dolor muscular o calfreds)

Cal que es posi en contacte amb el seu metge o l'Hospital de Dia si:

- Els efectes secundaris anteriorment descrits persisteixen més de 2 dies
- Presenta febre alta (més de 38<sup>o</sup>)
- Presenta problemes respiratoris, urticària o es nota la cara inflada.

## Controls

Després del tractament el seu metge li programarà algunes d'aquestes proves:

- Citoscòpia
- Ecografia
- Radiografia
- Citologia de l'orina: anàlisi d'orina que haurà de fer-se tres dies seguits, dues setmanes abans de la citoscòpia.

El seu metge li indicarà que s'haurà d'administrar 3 dosis més setmanals de BGC, i repetir periòdicament les proves anteriorment citades.