



## Mitomicina. Tractament de 6 setmanes

DATA	TRACTAMENT	N. DE DOSIS	SEGUIMENT INFERMERIA

### Indicacions

#### Abans del tractament

- Dutxa o higiene dels genitals.
- Quatre hores abans del tractament disminuir al màxim el consum de líquids (podeu esmorzar).
- Orinar just abans d'aplicar el tractament.

#### Després del tractament

- No heu de prendre líquids ni orinar durant 1,5-2 h per tal de mantenir la medicació a la bufeta.
- No heu d'estar immobilitzat; cal estirar-se al llit durant 1 h i anar canviant de posició cada 15 minuts, alternant costat dret, panxa enlaire, panxa avall i costat esquerre. La resta de temps pot caminar, estar assegut,...
- Un cop passades dues hores de l'administració del tractament, reiniciar la ingesta d'aigua. És recomanable prendre 1,5 L - 2L d'aigua en 24 h.
- 

#### Durant les 6 h posteriors al tractament

- Orinar assegut.
- Rentar-se les mans i els genitals després d'orinar.
- Tirar dos vasos de lleixiu al wc per neutralitzar el medicament, baixar la tapa i deixar-ho reposar durant 15 minuts abans de buidar la cisterna.
- En el cas que la roba es taqui d'orina, rentar-la a part amb abundant aigua i sabó.
- Es desaconsella mantenir relacions sexuals durant la setmana posterior a l'administració del tractament i en cas de mantenir-ne, cal usar preservatiu.

#### Possibles efectes no desitjats

- Miccions freqüents o doloroses.
- Restes de sang a orina.
- Picors i/o descamació dels palmells de les mans.
- Erupcions cutànies.

Si aquest efectes no desitjats **duren més de dos o tres dies** o presenteu **febres > 38° C** heu d'anar a urgències.