



Teràpia del BCG

DATA	TRACTAMENT	N. DE DOSIS	SEGUIMENT INFERMERIA

Indicacions

Abans del tractament

- Dutxa o higiene dels genitals.
- Quatre hores abans del tractament disminuir al màxim el consum de líquids (podeu esmorzar).
- Orinar just abans d'aplicar el tractament.

Després del tractament

- No heu de prendre líquids ni orinar durant 1,5-2 hores per tal de mantenir la medicació a la bufeta.
- No heu d'estar immobilitzat; cal estirar-se al llit durant 1 h i anar canviant de posició cada 15 minuts, alternant costat dret, panxa enlaire, panxa avall i costat esquerre. La resta de temps pot caminar, estar assegut,...
- Un cop passades dues hores de l'administració del tractament, reiniciar la ingesta d'aigua. És recomanable prendre 1,5 L - 2L d'aigua en 24 h.

Durant les 6 h posteriors al tractament

- Orinar assegut.
- Rentar-se les mans i els genitals després d'orinar.
- Tirar dos vasos de lleixiu al wc per neutralitzar el medicament, baixar la tapa i deixar-ho reposar durant 15 minuts abans de buidar la cisterna.
- En el cas que la roba es taqui d'orina, rentar-la a part amb abundant aigua i sabó.
- Es desaconsella mantenir relacions sexuals durant la setmana posterior a l'administració del tractament i en cas de mantenir-ne, cal usar preservatiu.

Possibles efectes no desitjats

- Miccions freqüents o doloroses.
- Sensació de cremor i coïssor en orinar que pot mantenir-se durant un o dos dies.
- Restes de sang a orina.
- Sintomatologia gripal: febre, calfreds, dolors musculars, cansament, nàusees o vòmits, mal de cap.

Si teniu febre >39°C durant més de 12 h, febre moderada (38°C) durant més de dos dies o algun signe de reacció al·lèrgica (com dificultat per respirar, sibilàncies, erupcions o cara inflamada) heu d'anar a urgències.