



## CYSTISTAT

---

DATA	TRACTAMENT	N. DE DOSIS	SEGUIMENT INFERMERIA

## Indicacions

### Abans del tractament

- Dutxa o higiene dels genitals.
- Quatre hores abans del tractament disminuir al màxim el consum de líquids (podeu esmorzar).
- Orinar just abans d'aplicar el tractament.

### Després del tractament

- No heu de prendre líquids ni orinar durant 1,5 (MÍNIM 30') per tal de mantenir la medicació a la bufeta.
- No heu d'estar immobilitzat; cal estirar-se al llit durant 1 h i anar canviant de posició cada 15 minuts, alternant costat dret, panxa enlaire, panxa avall i costat esquerre. La resta de temps pot caminar, estar assegut,...
- Un cop passades dues hores de l'administració del tractament, reiniciar la ingesta d'aigua. És recomanable prendre 1,5 L - 2L d'aigua en 24 h.

### Possibles efectes no desitjats

- Miccions freqüents o doloroses.
- Sensació de cremor i coïssor en orinar que pot mantenir-se durant un o dos dies.
- Prurit, edema, dolor, hipersensibilitat.

**Si teniu febre >38°C durant més de 24 h o signe de reacció al·lèrgica, heu d'anar a urgències.**