

Urticària

Servei de Pediatria

Què és la urticària?

La urticària consisteix en l'aparició a la pell de faves que piquen molt.

Les lesions acostumen a durar poc temps al mateix lloc. Mentre que apareixen en una zona de la pell, desapareixen en d'altres.

Poden anar acompanyades d'inflamació de mans, peus, colzes, cara i, excepcionalment, de dificultat per respirar o empassar.

Què heu de fer a casa?

- Vigileu l'aparició de dificultat per empassar o respirar.
- Eviteu fregar la pell del nen.
- No apliqueu a la pell medicació en pols o pomades sense consultar-ho al metge.
- Un nen amb urticària pot menjar els menjars habituals, però heu d'evitar aliments amb colorants.

Quan heu de consultar un Servei d'Urgències?

- Si el nen respira amb dificultat, té ronquera o xiulets.
- Si el nen no pot empassar o saliveja molt.
- Si el nen es troba malament o se li infla la cara.
- Si la urticària sorgeix després d'una picada o ingesta d'un aliment que anteriorment li hagi produït una reacció al·lèrgica.

Qüestions importants

- Durant la infància, la majoria de les urticàries són ocasionades per una infecció. La causa al·lèrgica és menys freqüent.
- Els brots de favasses, encara que habitualment duren entre set i vuit dies, poden continuar diverses setmanes.
- En la majoria dels casos, no cal cap estudi.



Urticaria

Servicio de Pediatría

¿Qué es la urticaria?

La urticaria consiste en la aparición en la piel de ronchas y habones que pican mucho. Las ronchas suelen durar poco tiempo en el mismo lugar. A la vez que aparecen en unas zonas de la piel, desaparecen de otras. Pueden acompañarse de inflamación de manos, pies, codos, cara y, excepcionalmente, de dificultad para respirar o tragar.

¿Qué debe hacer en casa?

- Vigile la aparición de dificultad para tragar o respirar.
- Evite frotar la piel del niño.
- No le aplique en la piel polvos o pomadas sin consultar con su médico.
- Un niño con urticaria puede comer su comida habitual.

¿Cuándo debe consultar un Servicio de Urgencias?

- Si el niño respira con dificultad, tiene ronquera o pitos.
- Si el niño no puede tragar o babea mucho.
- Si el niño se encuentra mal o se le hincha la cara.
- Si la urticaria aparece después de una picadura o de la ingestión de un alimento que anteriormente le haya producido una reacción alérgica.

Cuestiones importantes

- En la infancia, la mayoría de las urticarias están ocasionadas por una infección. La causa alérgica es menos frecuente.
- Los brotes de ronchas, aunque habitualmente duran unos siete u ocho días, pueden continuar varias semanas.
- En la mayoría de las ocasiones, no se necesita ningún estudio.