

## Instruccions Post Extravasació de Contrast Iodat o Gadoteriodol a SDI

(Se li entrega al pacient la pomada d'Hidrocortisona 1% i el flascó de Metilsulfòxid)

1. Apliqui fred local a la zona afectada mitjançant bosses de gel embolicades en gasses o un drap de cotó, mai directament, durant 30 minuts tres cops al dia.
2. A l'hospital li hem aplicat la pomada d'Hidrocortisona 1%. A les 6 hores vostè s'ha d'aplicar el Metilsulfòxid (flascó amb comptagotes) a la zona afectada fent un lleuger massatge perquè penetri a la pell.
3. Vagi alternant l'aplicació de la pomada d'Hidrocortisona 1% amb solució de Metilsulfòxid (flascó amb comptagotes) cada 6 hores. I així successivament durant tres dies.
4. Recomanem l'aplicació de calor local a la zona afectada minuts abans d'aplicar cada producte de tractament.
5. Si necessita algun calmant, pot prendre Gelocatil®; Ibuprofè® o Termalgin® sempre que no tingui cap contraindicació ni sigui al·lèrgic.
6. És normal que la pell en la zona afectada es torni violàcia o que surti un hematoma. Ha d'anar a l'hospital si:
  - Té febre.
  - Augmenta el dolor i no millora amb l'analgèsia.
  - Augmenta la grossor del braç, sent formigueig o apareixen ampolles a la pell.

Si té qualsevol dubte, truqui al nostre telèfon: 93 896 00 25, extensió 6022

## Instrucciones Post Extravasación de Contraste Iodado o Gadoteriodol en SDI

(Se le entrega al paciente pomada de Hidrocortisona 1% y frasco de Metilsulfóxido)

1. Aplique frío local en la zona afectada con bolsas de hielo envueltas en gasas o en un paño de algodón, nunca directamente, durante 30 minutos tres veces al día.
2. En el hospital le hemos aplicado la pomada de Hidrocortisona 1%. A las 6 horas, usted ha de aplicarse la solución de Metilsulfóxido (frasco con cuentagotas) en la zona afectada haciendo un ligero masaje para que penetre en la piel.
3. Vaya alternando la aplicación de la pomada de Hidrocortisona 1% con la solución de Metilsulfóxido (frasco con cuentagotas) cada 6 horas. Y así sucesivamente durante tres días.
4. Recomendamos que aplique calor local en la zona afectada minutos antes de aplicar cada producto del tratamiento.
5. Si necesita algún calmante puede tomar Gelocatil®; Ibuprofeno® o Termalgin® siempre que no tenga ninguna contraindicación ni sea alérgico.
6. Es normal que la piel en la zona afectada se vuelva violácea o aparezca un hematoma. Ha de acudir al hospital si:
  - Tiene fiebre.
  - Aumenta el dolor y no mejora con la analgesia.
  - Aumenta el grosor del brazo, siente hormigueo o aparecen ampollas en la piel.

Si tiene cualquier duda llame a nuestro teléfono: 93 896 00 25, extensión 6022