



PREPARACIÓ DEL PACIENT PER FIBROGASTROSCÒPIA

- **VOSTÈ HA DE VENIR EN DEJÚ DE 8 HORES ABANS DE LA PROVA**
- **POT BEURE AIGUA FINS A 4 HORES ABANS DE LA PROVA**

ADVERTÈNCIES

- Si ha de prendre medicació dins de les 6 hores abans de la prova, consulti amb el seu metge. Si l'ha de prendre, empassi la mínima quantitat d'aigua possible.
- Informi al seu metge si està embarassada o creu que pot estar-ho.
- Si pren TRIFLUSAL (DISGREN®), CLOPIDOGREL(PLAVIX®, ISCOVER®), PRASUGREL(EFIENT®) a qualsevol dosi; o AAS (ADIRO®, ASPIRINA®, TROMALYT®,...) en dosis superiors a 150mg; o altres medicament per a la coagulació de la sang, l'ha de suspendre 5 dies abans de la prova, tret que el seu metge li indiqui el contrari. Si pren ACENOCUMAROL (SINTROM®) o altre anticoagulant, consulti al metge que li controla.
- Si és DIABÈTIC/A, el dia de la prova no prengui la medicació corresponent (antidiabètics orals, insulina) fins que realitzi la prova.

- **Si la gastroscòpia s'ha sol·licitat amb SEDACIÓ, ha de venir acompanyat i no podrà conduir.**
- **Si no pot venir a la cita o per qualsevol dubte, truqui al telèfon 938960025, extensió 3551 o bé 6416.**